

2. Durchfall/Diarrhoe



5. Quelle

	Hausmittel	Schulmedizin	Spezielles
2. Durchfall/ Diarrhoe, siehe Bild, wässrig, zum Teil schleimig, nicht verwechseln mit senfgelb von der Muttermilch	Ernährung, stopfende Kost: Ab 4 Mt.: Banane Ab 6 Mt.: Reis, Pasta, Griess, Babyzwieback, geriebener Apfel, Ab 12. Mt. Salzstängeli, Haferschleimsuppe, magere Bouillon, Drittelslösung: Schwarztee, Wasser, O saft, je 1/3 und eine Prise Salz	z.B. Bioflorin oder Perenterol Kps. öffnen und ins Essen/ Schoppen reingeben, max. 3x1 Kps. pro 24h, Mit KA besprechen: Kohletbl., ab einjährig z.B. Carbovelure oder Elektrolyte- Mischung z.B. GES 45	lactosefreie Milch ab 4 Mt., mit KA besprechen z.B. HN 25 von Aptamil, bei akutem Durchfall lauwarmer Bauch- kompresse, siehe nächste Seite

2. Durchfall/ Bauchkomresse bei einem Baby



3. Quelle, S.37

Material: Dampfkompresse, Fanellwindel oder gr. Nuschi, Bindenklammerchen oder Sicherheitsnadeln

Handhabung:

Kompresse in lauwarmes Wasser, am Unterarm prüfen, mild ist ideal für das Baby, Kompresse auf den Bauch legen und Baby beobachten, siehe Bild, wenn das Baby daran gefallen hat, wickle die gefaltete darunterliegende Fanellwindel/Nuschi rundum und befestige sie. Windel anziehen. Baby in den Schlafanzug oder in ein Tuch wickeln/Tragetuch, siehe Bild.



3. Quelle, S.37

Drittellösung bei Magendarm-Grippe von Dr. med. Ursula Keller, Kinderärztin Schwyz

Ab 10 Mt.

3dl abgekochtes Wasser

3dl Schwarztee

3dl Orangensaft

3 EL Traubenzucker oder normaler Zucker

1 Messerspitze Salz

Alles mischen, lauwarm oder gekühlt trinken

Davon die ersten 2 Stunden:

Alle 15min 5 Teelöffel oder Schlücke verabreichen

Wenn 2 Stunden lang nicht erbrochen, darf nach Lust und Laune getrunken werden